


Exercice 100

1.



2. On commence par calculer les coordonnées des vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{DC} :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 - (-1) \\ -1 - (-2) \end{pmatrix} \text{ donc } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 6 - 0 \\ 3 - 2 \end{pmatrix} \text{ donc } \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On constate que les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{DC} ont les mêmes coordonnées. Ces vecteurs sont donc égaux.

On en déduit que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.


Méthode

On utilise la méthode décrite dans l'exercice résolu 4, page 319


Conseil

- Attention à l'ordre des points.
ABCD
parallélogramme
alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

- On peut vérifier graphiquement les coordonnées des vecteurs ainsi que le fait que ABCD est bien un parallélogramme.



3. Construction du point E :



4. Nous allons utiliser l'égalité de la question précédente et exprimer que les vecteurs figurant dans chaque membre de l'égalité ont les mêmes coordonnées.

- Exprimons les coordonnées du vecteur \overrightarrow{AE} .

Appelons x_E et y_E les coordonnées du point E. Alors

$$\overrightarrow{AE} \begin{pmatrix} x_E - (-1) \\ y_E - (-2) \end{pmatrix} \text{ soit } \overrightarrow{AE} \begin{pmatrix} x_E + 1 \\ y_E + 2 \end{pmatrix}$$

- Calculons les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$.

On a $\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$ (question 2.)

On en déduit donc que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} \left(\begin{smallmatrix} 5 \\ 2 \end{smallmatrix} \right)$.

- Les vecteurs \overrightarrow{AE} et $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$ ont les mêmes coordonnées

• Les vecteurs \vec{AE} et $\vec{AB} + \vec{CB}$ ont les mêmes coordonnées. Donc $x_E + 1 \equiv 5$ et $y_E + 2 \equiv -3$.

On en déduit que $x_E = 5 - 1 = 4$ et $y_E = -3$.

Le point E a donc pour coordonnées $E(4 ; -5)$.

For more information, visit www.earth911.org.

5.a. Avec coordonnées :

5.a. Avec coordonnées :

On calcule les coordonnées des deux vecteurs et on vérifie qu'ils ont les mêmes coordonnées.

$\overrightarrow{BE} \begin{pmatrix} 4-5 \\ -5-(-1) \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{BE} \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$

De même, on trouve $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ donc $-\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$

On constate que $\overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{BC}$.

Sans coordonnées :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} \text{ par définition de } E.$$

Or $\overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BE}$ par la relation de Chasles
donc $\overline{BE} = \overline{CB} = -\overline{BC}$

5.b. On peut déduire de l'égalité $\overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{BC}$ que B est le milieu du segment [CE].

Méthode

Conseil

On contrôle sur le graphique la cohérence des coordonnées de E trouvées par le calcul.