

Chapitre 5 – Exercice guidé page 169

1.a. Calculons $AX + C$:

$$\begin{aligned} AX + C &= \begin{bmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,5 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}. \\ &= \begin{bmatrix} 0,5 \times 16 + 0,25 \times 20 + 0,25 \times 12 \\ 0,25 \times 16 + 0,5 \times 20 + 0,25 \times 12 \\ 0,25 \times 16 + 0,25 \times 20 + 0,5 \times 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{d'où } AX + C = \begin{bmatrix} 16 \\ 17 \\ 15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix} \text{ c'est-à-dire } AX + C = X.$$

1.b. • Montrons que pour tout n de \mathbb{N} , $Y_{n+1} = AY_n$.

$Y_{n+1} = X_{n+1} - X$ par définition de (Y_n) .

Or $X_{n+1} = AX_n + C$ (1) par définition de (X_n) et $X = AX + C$ (2) par la question 1.a.

Par différence membre à membre de (1) et (2), on déduit que $X_{n+1} - X = AX_n - AX$, ce qui s'écrit encore $X_{n+1} - X = A(X_n - X)$ soit $Y_{n+1} = AY_n$.

• Par une récurrence immédiate, pour tout n de \mathbb{N} , $Y_n = A^n Y_0$ (*)

Autrement dit, pour tout n de \mathbb{N} , $X_n - X = A^n(X_0 - X)$ ce qui donne $X_n = A^n(X_0 - X) + X$.

(*) On peut mettre en forme cette récurrence :

① Initialisation : Montrons que l'égalité est vraie pour $n = 0$.

Pour $n = 0$, on a $Y_n = Y_0$ et d'autre part, $A^n Y_0 = A^0 Y_0 = I_3 Y_0 = Y_0$

L'égalité est donc vérifiée pour $n = 0$.

② Héritage : Soit n un entier supérieur ou égal à 0.

Supposons que pour cet entier on ait $\mathbf{Y}_n = \mathbf{A}^n \mathbf{Y}_0$.

Alors $\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{A} \mathbf{Y}_n = \mathbf{A} \mathbf{A}^n \mathbf{Y}_0$ par hypothèse de récurrence. Donc $\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{A}^{n+1} \mathbf{Y}_0$ ce qui démontre l'héritage.

③ Conclusion : pour tout $n \geq 0$, $\mathbf{Y}_n = \mathbf{A}^n \mathbf{Y}_0$.

$$2.a. \quad \mathbf{B} = 4\mathbf{A} - 2\mathbf{I} = 4 \begin{bmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,5 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,5 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

b. • Calculons \mathbf{B}^2 et $2\mathbf{I} + \mathbf{B}$:

$$\mathbf{B}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$2\mathbf{I} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

On constate que $\mathbf{B}^2 = 2\mathbf{I} + \mathbf{B}$.

• Montrons par récurrence que pour tout $n \geq 0$, il existe des réels α_n et β_n tels que $\mathbf{A}^n = \alpha_n \mathbf{I} + \beta_n \mathbf{B}$.

① Initialisation : Montrons que ceci est vrai pour $n = 0$.

Pour $n = 0$, on a $\mathbf{A}^0 = \mathbf{I}$ donc $\mathbf{A}^0 = \alpha_0 \mathbf{I} + \beta_0 \mathbf{B}$ avec $\alpha_0 = 1$ et $\beta_0 = 0$.

② Héritage : Soit n un entier supérieur ou égal à 0.

Supposons que pour cet entier on ait $\mathbf{A}^n = \alpha_n \mathbf{I} + \beta_n \mathbf{B}$.

Alors $\mathbf{A}^{n+1} = \mathbf{A}^n \mathbf{A} = (\alpha_n \mathbf{I} + \beta_n \mathbf{B}) \mathbf{A}$ par hypothèse de récurrence

Or $\mathbf{B} = 4\mathbf{A} - 2\mathbf{I}$, donc $\mathbf{A} = \frac{1}{4}\mathbf{B} + \frac{1}{2}\mathbf{I}$.

Par conséquent, $A^{n+1} = (\alpha_n I + \beta_n B) \left(\frac{1}{4} B + \frac{1}{2} I \right)$. En développant,

$$A^{n+1} = \frac{1}{4} \alpha_n B + \frac{1}{2} \alpha_n I + \frac{1}{4} \beta_n B^2 + \frac{1}{2} \beta_n B$$

En remplaçant B^2 par $2I + B$, on obtient

$$A^{n+1} = \frac{1}{4} \alpha_n B + \frac{1}{2} \alpha_n I + \frac{1}{2} \beta_n I + \frac{1}{4} \beta_n B + \frac{1}{2} \beta_n B$$

$$A^{n+1} = \left(\frac{1}{2} \alpha_n + \frac{1}{2} \beta_n \right) I + \left(\frac{1}{4} \alpha_n + \frac{3}{4} \beta_n \right) B$$

On a donc bien $A^{n+1} = \alpha_{n+1} I + \beta_{n+1} B$ avec $\alpha_{n+1} = \frac{1}{2} \alpha_n + \frac{1}{2} \beta_n$ et $\beta_{n+1} = \frac{1}{4} \alpha_n + \frac{3}{4} \beta_n$. L'hérédité est donc établie.

③ Conclusion : Pour tout $n \geq 0$, $A^n = \alpha_n I + \beta_n B$ avec les suites (α_n) et (β_n) telles que $\alpha_0 = 1$ et $\beta_0 = 0$ et, pour tout n de \mathbb{N} , $\alpha_{n+1} = \frac{1}{2} \alpha_n + \frac{1}{2} \beta_n$ et $\beta_{n+1} = \frac{1}{4} \alpha_n + \frac{3}{4} \beta_n$.

3. a. On sait que $U_{n+1} = \begin{bmatrix} \alpha_{n+1} \\ \beta_{n+1} \end{bmatrix}$

$$\text{On a donc } U_{n+1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \alpha_n + \frac{1}{2} \beta_n \\ \frac{1}{4} \alpha_n + \frac{3}{4} \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_n \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,25 & 0,75 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_n \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

Ceci s'écrit encore $U_{n+1} = M U_n$. On en déduit par une récurrence immédiate que pour tout n de \mathbb{N} , $U_n = M^n U_0$.

b. Calculons MV et MW

$$MV = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,25 & 0,75 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 + 0,5 \\ 0,25 + 0,75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = V.$$

$$MW = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,25 & 0,75 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \times 0,5 + 0,5 \\ -2 \times 0,25 + 0,75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0,25 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} W.$$

1 et $\frac{1}{4}$ sont des valeurs propres de M.

c. M admet pour autre valeur propre $\mu = 1$ et $= \frac{1}{4}$.

Alors $M = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{bmatrix} \mu & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,25 \end{bmatrix}$ et $P = [V \ W] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

On a alors pour tout $n \geq 1$, $M^n = PDP^{-1}PDP^{-1}\dots PDP^{-1}$ où $P^{-1}P = I$.

Donc $M^n = PDID\ldots DIP^{-1} = PDD\ldots DP^{-1} = PD^nP^{-1}$.

d. P a pour déterminant $1 \times 1 - 1 \times (-2) = 3$, donc $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ (propriété 3 page 130). Comme D est diagonale, on sait calculer D^n :

$$D^n = \begin{bmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 0,25^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,25^n \end{bmatrix}.$$

On a alors $M^n = PD^nP^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,25^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, soit

$$M^n = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 \times 0,25^n \\ 1 & 0,25^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 + 2 \times 0,25^n & 2 - 2 \times 0,25^n \\ 1 - 0,25^n & 2 + 0,25^n \end{bmatrix}.$$

e. Comme $0 < 0,25 < 1$, la limite de $0,25^n$ est 0 quand n tend vers $+\infty$, donc M^n tend vers la matrice $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Comme $U_n = M^n U_0$, on en déduit que U_n

tend vers $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} U_0 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

Par conséquent U_n tend vers $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, ce qui signifie que les suites (α_n) et (β_n) ont toutes deux pour limite $\frac{1}{3}$ quand n tend vers $+\infty$.

4. Les suites (α_n) et (β_n) ont pour limite $\frac{1}{3}$, donc A^n tend vers $\frac{1}{3}(I + B)$.

De $X_n = A^n(X_0 - X) + X$, on déduit que X_n tend vers $\frac{1}{3}(I + B)(X_0 - X) + X$.

Calculons $\frac{1}{3}(I + B)(X_0 - X) + X$:

$$\frac{1}{3}(I + B) = \frac{1}{3} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X_0 - X = \begin{bmatrix} 12 \\ 16 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 16 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix}, \text{ donc}$$

$$\frac{1}{3}(I + B)(X_0 - X) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -10 \\ -10 \\ -10 \end{bmatrix} \text{ et}$$

$$\frac{1}{3}(I + B)(X_0 - X) + X = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -10 \\ -10 \\ -10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{38}{3} \\ \frac{50}{3} \\ \frac{26}{3} \end{bmatrix}.$$

Dire que X_n tend vers $\begin{bmatrix} \frac{38}{3} \\ \frac{50}{3} \\ \frac{26}{3} \end{bmatrix}$ signifie que les suites (p_n) , (q_n) et (r_n) tendent respectivement vers $\frac{38}{3}$, $\frac{50}{3}$, $\frac{26}{3}$.